


**Auszug aus einer Standortskarte mit Erläuterungen:**



**Auszug aus der dazugehörigen Standortstabelle**

Standortseinheit	Beschreibung	Waldbauliche Besonderheiten	Mögliche Bestockung
<b>373</b> ziemlich frischer Schlufflehm über Fließerde	<p><b>Substrat:</b> Schlufflehmdecke oder -schicht aus mittel- bis feinsandigem, lehmigem Schluff bis schluffigem Lehm; häufig steinig (bis 40 % - Hornsteinskelett; über Fließerde (solifluktiv und durch Frostverwürgung stark verdichteter Mischlehm aus Lößlehm, KVL, Kreide- oder Tertiärton); Verdichtung bzw. leichte Staumerkmale höher 80 cm unter Flur; daher Durchlüftung und Durchwurzelbarkeit eingeschränkt;</p> <p><b>Wasserhaushalt:</b> gut;</p> <p><b>Nährstoffversorgung:</b> gut;</p> <p><b>pH:</b> 3,2 - 5,0;</p> <p><b>Bodentyp:</b> (Para-) Braunerde;</p> <p><b>Humusform:</b> Moder bis rohhumusartiger Moder;</p> <p><b>Relief:</b> ebene bis mäßig geneigte Lagen</p>	<p><b>Wuchsleistung:</b> gut</p> <p><b>Gefährdungen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fließerde von Fichte und Buche nur eingeschränkt durchwurzelbar, daher Tiefwurzler beteiligen; Sturmwurfkategorie „beginnend labil“</li> <li>2. Gefahr der Oberbodendegradierung, daher Laubholz beteiligen</li> <li>3. in Muldenlage Frostgefahr (hier keine Lärche)</li> <li>4. bei Freilage starke Gefahr der Bodenverwitterung</li> </ol>	<p><b>Fichten-Tannen-Buchen-Lärchen-Bestand</b> (Beimischung. mind. 30 %)</p> <p><b>Stieleichen-Laubholz (Buche, Hainbuche, Winterlinde) - Bestand</b></p>